



Journées dermatologiques de Paris



02/06
DÉCEMBRE

PALAIS DES CONGRÈS
PORTE MAILLOT - PARIS

www.lesjdp.fr



2
0
2
5

Liens d'intérêt

Aucun

Les patients atteints d'hidrosadénite suppurée et ayant une non-observance précoce ont-ils un profil démographique et clinique particulier ?

Données en vie réelle de l'étude OMCCI

C. Dorado Cortez

F. Maccari²; N. Quiles-Tsimaratos ³; K. Vélia ¹; A. Badaoui⁴;

D. Pourchot⁵; E. Esteve ⁶; AC. Fougerousse ⁴; D. Simonian ⁷; Z. Reguiai⁸;
JL. Perrot




Les études sur l'hidrosadénite suppurée (HS) se focalisent principalement sur :

- l'efficacité,
- la tolérance,

Les données disponibles sont limitées concernant les patients :

- chez qui un traitement systémique est instauré,
- mais qui ne poursuivent pas le suivi après cette initiation.



Introduction




Journées
dermatologiques
de Paris

02/06
DÉCEMBRE

PALAIS DES CONGRÈS

Objectif de l'étude :

- identifier le profil des patients perdus de vue très précocement (PPHP) après la visite d'initiation,
- à partir des données du registre national OMCCI.



Méthodes



Journées
dermatologiques
de Paris

02/06
DÉCEMBRE
PALAIS DES CONGRÈS

Comparaison entre deux groupes de patients :

- PPHP : patients perdus de vue, non revus aux visites **M6** et **M12**
- OP : patients observants, toujours suivis jusqu'à **M24**



Variables analysées :

- Caractéristiques démographiques
- Caractéristiques sociales
- Caractéristiques cliniques
- Caractéristiques subjectives (ressenti, qualité de vie...)



Origine des données :

- Issues du **contexte habituel de consultation dermatologique**
- Données recueillies dans le registre national OMCCI



Méthodes



Journées
dermatologiques
de Paris

02/06
DÉCEMBRE
PALAIS DES CONGRÈS

Comparaison entre deux groupes de patients :

- PPHP : patients perdus de vue, non revus aux visites **M6** et **M12**
- OP : patients observants, toujours suivis jusqu'à **M24**



Variables analysées :

- Caractéristiques démographiques
- Caractéristiques sociales
- Caractéristiques cliniques
- Caractéristiques subjectives (ressenti, qualité de vie...)




Origine des données :


- Issues du **contexte habituel de consultation dermatologique**
- Données recueillies dans le registre national OMCCI




Résultats



PPHP
55 patients sur 440
de la cohorte HS



Satisfaction thérapeutique



- Les patients PPHP présentent :
 - une forme moins sévère d'**HS** (Hurley I),
 - une meilleure **satisfaction** vis-à-vis des traitements antérieurs.
- Une partie d'entre eux pourrait avoir développé une **résilience psychologique**, malgré la présence de lésions inflammatoires visibles.
- Ce résultat questionne la tendance du clinicien à **intensifier les traitements** en se basant principalement sur :
 - l'**aspect lésionnel**,
 - sans intégrer suffisamment le **ressenti subjectif** du patient.
- Une stratégie plus **individualisée**, tenant compte de la dimension psychologique, pourrait :
 - réduire les **ruptures précoces** du suivi,
 - améliorer l'**adhésion thérapeutique** et la continuité du parcours de soins.

Conclusion



Journées
dermatologiques
de Paris

02/06
DÉCEMBRE

PALAIS DES CONGRÈS

Dans l'HS l'adhésion thérapeutique dépend autant du ressenti subjectif et du vécu psychosocial du patient que de la sévérité clinique

Besoin d'une prise en charge centrée sur la personne pour éviter les ruptures précoces de suivi.

