COHORTE DE PATIENTS FRANÇAIS TRAITÉS PAR BIMEKIZUMAB POUR UN PSORIASIS MODÉRÉ À SÉVÈRE JUSQU'À 2 ANS DE SUIVI

E. Cinotti1; JL. Perrot2; G. Chaby3; Z. Reguiai4; PA. Bécherel5; C. Lepelley-Dupont6; D. Denis7; AL. Liegeon8; C. Boulard9; C. Fite10; I. Zaraa10; E. Begon11; L. Mery Bossard12; D. Thomas-Beaulieu13; D. Pourchot14; J. Parier15; C. Jacobzone Leveque16; C. Garcia17; AC. Fougerousse18; M. D'onghia1; D. Simonian19; F. Maccari1; OMCCI GROUP

1 CHU Sienne, Italie; 2CHU Saint-Étienne, 3CHU d'Amiens-Picardie, 4Polyclinic Courlancy-Bezannes, Reims, 5Hôpital Privé d'Antony, 6, 7Cabinet privé, Vannes, 8CHR Metz-Thionville, 9Groupe Hospitalier du Havre, Montivilliers, 10Hôpital Paris Saint-Joseph, 11CH de Brive, Brive-la-Gaillarde, 12CH Poissy Saint Germain en Laye, 13,14CH intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, 15Cabinet libéral, La Varenne Saint Hilaire, 16Groupe Hospitalier Bretagne Sud, Lorient, 17CH Emile Roux, Le Puy-en-Velay, 18Hôpital d'Instruction des Armées Bégin, Saint-Mandé, 19RESO, Paris.

Aucun lien d'intérêts.

Le bimékizumab (BMZ) est un anticorps monoclonal avec double ciblage **anti-IL-17A et IL-17F** indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère. Les données des essais cliniques ont montré une efficacité remarquable, confirmée par plusieurs études en vie réelle avec un court suivi.

L'objectif de notre étude est d'évaluer l'efficacité à long terme du BMZ en vie réelle, avec un suivi de 2 ans.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

- **132 patients atteints de PSORIASIS** inscrits dans le **registre français OMCCI** qui ont reçu BMZ
- Étude multicentrique **prospective** et **observationnelle**

Evaluation :

- **L'efficacité** a été évaluée à l'aide de mesures de résultats fournies par les cliniciens et les patients, y compris **les scores de qualité de vie**
- Les **événements indésirables (EI)** ont également été évalués.

RÉSULTATS

53 patients avec suivi à 2 ans ont été inclus dans l'étude

- 21 (39,6%) **femmes**
- **Age moyen** 46,3 ± 15.5 ans
- **PASI (médian [IQR]) 15 (10,20)** et **DLQI (médian [IQR]) 11 (8,14)**

Evaluation **après 1 an**:	Evaluation **après 2 ans:**
PASI (médian [IQR]) 1 (0,3)	**PASI (médian [IQR]) 0** (0,1)
PASI 90 69,8 % à 1 an	**PASI 90 88,7 %**
PASI 100 20,8% à 1 an	**PASI 100 39,6 %**
DLQI (médian [IQR]) 1 (0,3)	DLQI **(médian [IQR]) 0** (0,1)



Chez les patients ayant un PASI initial >10, les taux de réponse PASI 90 étaient significativement plus élevés ($p < 0,01$). Aucune différence significative n'était observée entre patients bionaïfs (n=24) et ceux préalablement exposés à une biothérapie (n=29) en termes de PASI initial, PASI à 1 et 2 ans, réponse PASI 90/100 et DLQI.





Figure 1. ***Efficacité et qualité de vie***

CONCLUSION

BMZ a une **efficacité clinique durable** avec des **taux élevés de réponse** PASI 90 et 100 à 2 ans, ainsi qu'une amélioration significative et soutenue de la **qualité de vie**.